


VISIBL-MS

Bilingual framework for early Multiple Sclerosis (MS) awareness

V I S I B L Y



PAINFUL LOSS OF VISION, LOSS OF COLOR VISION



BALANCE, BELLY/BACK NUMBNESS



LIMB NUMBNESS AND WEAKNESS




YOUNG PEOPLE

V I S I B L E



PÉRDIDA DE VISIÓN DOLOROSA, PÉRDIDA DE VISIÓN EN COLOR



PÉRDIDA DE BALANCE, CAMINO COMO BORRACHO, PÉRDIDA DE SENSACIÓN EN LA BARRIGA Y ESPALDA



PÉRDIDA DE LOCOMOCIÓN Y SENSACIÓN EN LAS PIERNAS



EDAD JOVEN

How to use VISIBL-MS and disclaimer:

Please use the mnemonic and the visuals in Figure 1 as a memory tool to recognize possible early signs and symptoms of Multiple Sclerosis (MS). The color gradients of green and red hues are included to illustrate color desaturation, a phenomenon often seen in people who experience optic neuritis, which is often an early manifestation of MS. **VISIBLY/E should not be used to diagnose MS. It is simply a way to raise awareness of early MS signs and to prompt a thorough evaluation and necessary testing by a physician or ED to make sure MS is considered given the presence of VISIBLY/E symptoms.** If you or your patient has experienced these symptoms, please consider the possibility of MS among other neurological conditions. Please note that MS can present in several ways and this mnemonic doesn't include all symptoms, for instance face numbness is not included. The diagnosis of MS is made using diagnostic criteria which typically requires imaging and other laboratory testing in addition to clinical signs and symptoms.

Como usar VISIBL-MS y advertencia:

Por favor use el instrumento VISIBL-MS para reconocer los signos y síntomas de la Esclerosis Múltiple (EM) temprana. Los diferentes tonos de rojo y verde representan la pérdida de saturación de colores, que afecta a los pacientes con neuritis óptica. El instrumento VISIBLY/E no debe ser utilizado para diagnosticar la EM. Es una forma simple de incrementar la vigilancia para la EM y alertar a los médicos para que se haga una evaluación rápida basada en los síntomas "VISIBLE". **Si usted o alguna persona tiene estos síntomas, por favor considere la posibilidad de EM y la necesidad de ir a un médico o a la sala de emergencia.** La EM puede presentarse de varias formas y los síntomas presentados no incluyen todos los síntomas de la EM, por ejemplo, adormecimiento de la cara no está incluido. El diagnóstico de la EM es basado en criterios diagnósticos, que requiere imágenes del cerebro y exámenes de laboratorios además de síntomas y signos clínicos.

How to cite: *Patel S, Rafferty S, Aquino L, Chadha S, Ginocchio G, Cyr B, Fedorko J, Imitola J. VISIBL-MS: A Bilingual Educational Framework to Increase Awareness of Early Multiple Sclerosis. MSJ 2024*

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13524585241228739>

© Patel, Imitola et al, 2024